

STOP 糖尿病

2025 年 10 月 6 日発行 糖尿病ケアチーム通信 第 5 号

SGLT2 阻害薬の適応について

SGLT2 阻害薬は近位尿細管でのグルコースの再吸収を阻害することにより、グルコースの尿中排泄を促進し、**血糖値を低下**、体重や体脂肪を減少させ、エネルギー基質利用を炭水化物から脂質やケトン体にシフトさせます。それにより糖代謝改善、肥満改善、インスリン抵抗性改善などが期待できます。

その他にも**心保護作用**、**腎保護効果**があるため、**糖尿病以外にも慢性心不全や慢性腎臓病に適応がある薬剤**もあります。

効能又は効果	製品名	適応規格
2型糖尿病	ジャディアンス	10mg / 25mg
	スーグラ	25mg / 50mg
	デベルザ	20mg
	フォシーガ	5mg / 10mg
	ルセフィ	2.5mg / 5mg
	カナグル	100mg
1型糖尿病	スーグラ（インスリン併用）	25mg / 50mg
	フォシーガ（インスリン併用）	5mg / 10mg
慢性心不全	ジャディアンス	10mg
	フォシーガ	10mg ※(5mg)
慢性腎臓病	ジャディアンス	10mg
	フォシーガ	10mg ※(5mg)
2型糖尿病を合併する慢性腎臓病	カナグル	100mg

★慢性心不全と慢性腎臓病に適応がある薬剤

ジャディアンス錠 10mg (20mg には適応なし)

フォシーガ錠 5mg、10mg

用法はジャディアンス錠とフォシーガ錠、慢性心不全・慢性腎臓病共に **1日1回10mg**

※注意点として、フォシーガ錠 5mg にも慢性心不全・慢性腎臓病に適応がありますが、用法は1日1回10mg となり1日1回5mg の適応は糖尿病のみとなります

★2型糖尿病を合併する慢性腎臓病に適応がある薬剤

カナグル錠 100mg

用法は **1日1回100mg**

