

# STOP 糖尿病

H28年 糖尿病ケアチーム通信 第5号

## 糖尿病治療薬情報

(配合薬について)

### メタクト配合錠LD、HD (ピオグリタゾン塩酸塩/メトホルミン塩酸塩)



LD→ピオグリタゾン 15mg / メトホルミン塩酸塩 500mg  
HD→ピオグリタゾン 30mg / メトホルミン塩酸塩 500mg

【用法・用量】

通常、1日1回1錠を**朝食後**に経口投与

【副作用】

浮腫、肝機能障害、乳酸アシドーシス

【注意事項】

**ヨード造影剤を用いる検査を行う患者には休薬が必要**

### ソニアス配合錠LD、HD (ピオグリタゾン塩酸塩/グリメピリド)



LD→ピオグリタゾン 15mg / グリメピリド 1mg  
HD→ピオグリタゾン 30mg / グリメピリド 3mg

【用法・用量】

通常、1日1回1錠を**朝食前又は朝食後**に経口投与

【副作用】

浮腫、肝機能障害、低血糖

【注意事項】

**SU剤含有のため低血糖に注意**

### リオベル配合錠LD、HD (ピオグリタゾン塩酸塩/アログリプチン)



LD→ピオグリタゾン 15mg / アログリプチン 25mg  
HD→ピオグリタゾン 30mg / アログリプチン 25mg

【用法・用量】

通常、1日1回1錠を**朝食前又は朝食後**に経口投与

【副作用】

浮腫、肝機能障害

【注意事項】

中等度以上の腎機能障害患者は**各単剤を併用**

### エクメット配合錠LD、HD (ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩)



LD→ビルダグリプチン 50mg / メトホルミン塩酸塩 250mg  
HD→ビルダグリプチン 50mg / メトホルミン塩酸塩 500mg

【用法・用量】

通常、**1日2回1回1錠**を朝、夕に経口投与

【副作用】

便秘、下痢、乳酸アシドーシス

【注意事項】

**ヨード造影剤を用いる検査を行う患者には休薬が必要**

### グルベス配合錠 (ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース)



ミチグリニドカルシウム水和物 10mg / ボグリボース 0.2mg

【用法・用量】

通常、**1日3回1回1錠**を**毎食直前**経口投与

【副作用】

低血糖症状、腹部膨満感

【注意事項】

効果的に食後血糖上昇を抑制するため**毎食直前(5分以内)**にすること

~お知らせ~

次回の糖尿病チームの勉強会は、1月16日(月)本館3F会議室にて検査科担当で行います。

文責 薬剤師 木村・新井山